

**PROSPECT: INFORMATII PENTRU UTILIZATOR****Tavipec, 150 mg, capsule moi gastrorezistente**

**Cititi cu atentie si in intregime acest prospect, deoarece el contine informatii importante pentru dumneavoastra.**

Acest medicament este disponibil fara prescriptie medicala. Cu toate acestea, este necesar sa utilizati Tavipec cu atentie, pentru a obtine cele mai bune rezultate.

- Pastrati acest prospect. S-ar putea sa fie necesar sa-l recititi.
- Intrebati farmacistul daca aveti nevoie de mai multe informatii sau sfaturi.
- Trebuie sa va prezentati la medic daca simptomele dumneavoastra se inrautatesc sau nu se imbunatatesc dupa 3 zile.
- Daca vreuna dintre reactiile adverse devine gravă sau daca observati orice reactie adversă nementionată în acest prospect, va rugam sa-i spuneti medicului dumneavoastra sau farmacistului.

**In acest prospect gasiti:**

1. Ce este Tavipec si pentru ce se utilizeaza
2. Inainte sa utilizati Tavipec
3. Cum sa utilizati Tavipec
4. Reactii adverse posibile
5. Cum se pastreaza Tavipec
6. Informatii suplimentare

**1. CE ESTE TAVIPEC SI PENTRU CE SE UTILIZEAZA**

Tavipec este un medicament cu acțiune secretolitică, expectorantă.

Adjuvant în tratamentul rinitelor, rinosinuzitelor acute sau cronice și a bronșitelor acute sau cronice.

**2. INAINTE SA UTILIZATI TAVIPEC****Nu utilizati Tavipec in caz de:**

- Hipersensibilitate la *Lavandula latifolia*;
- Copii sub 6 ani.

**Aveti grija deosebita cand utilizati Tavipec**

In cazul respectarii dozelor recomandate, nu sunt necesare masuri de precautie. Se recomanda sa va adresati medicului in cazul in care sunteti insarcinata sau alaptati.

**Utilizarea altor medicamente**

Va rugam sa spuneti medicului dumneavoastra sau farmacistului daca luati sau ati luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fara prescriptie medicala.

Nu sunt cunoscute interactiuni cu alte medicamente.

### **Utilizarea Tavipec cu alimente si bauturi**

Se recomanda administrarea cu o jumatate de ora inainte de mese.

Trebuie evitata utilizarea Tavipec concomitent cu consumul de bauturi alcoolice.

### **Sarcina si alaptarea**

Adresati-va medicului dumneavoastra sau farmacistului pentru recomandari inainte de a lua orice medicament.

Nu exista studii controlate la gravide. Uleiul volatil de *Lavandula latifolia* contine cetone care in functie de doza pot fi neurotoxice (in doze mari pot provoca convulsii) si emenagoge. Nu este cunoscut daca uleiul volatil de *Lavandula latifolia* trece la fat sau in laptele matern. De aceea Tavipec se poate administra la gravide sau la femei care alapteaza doar daca este absolut necesar, sub supraveghere medicala, dupa aprecierea raportului beneficiu matern/risc fetal.

### **Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor**

Deoarece uleiul volatil de *Lavandula latifolia* prezinta proprietati sedative, se recomanda prudenta in cazul conducerii de vehicule sau de folosire a utilajelor.

## **3. CUM SA UTILIZATI TAVIPEC**

Utilizati intotdeauna Tavipec exact asa cum v-a spus medicul dumneavoastra. Trebuie sa discutati cu medicul dumneavoastra sau cu farmacistul daca nu sunteti sigur.

*Adulti si adolescenti peste 12 ani:*

Doza recomandata este de 1 sau 2 capsule de trei ori pe zi. Se administreaza pe cale orala, nemestecate, cu aproximativ jumatate de ora inaintea meselor.

Nu exista studii adecvate privind administrarea la copii.

### **Daca utilizati mai mult decat trebuie din Tavipec**

Daca apar reactii adverse adresati-va unui serviciu medical specializat.

### **Daca uitati sa utilizati Tavipec**

Nu dublati dozele pentru a recupera doza omisa.

Continuati cu doza obisnuita dupa orarul normal.

### **Daca incetati sa utilizati Tavipec**

Nu reprezinta un pericol direct dar se recomanda sa va adresati mai intai medicului.

Pentru informatii suplimentare privind modul de administrare si pentru stabilirea duratei tratamentului se recomanda ca pacientul sa se adreseze medicului.

## **4. REACTII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, Tavipec poate determina reactii adverse, cu toate ca nu apar la toate persoanele.

Pot apare reactii alergice. Ocazional au fost observate ca reactii adverse eructatia si greata de intensitate scazuta. Respiratia poate avea un usor miros de ulei eteric, perceptibil ca a fi placut.

Daca vreuna dintre reactiile adverse devine gravă sau daca observati orice reactie adversă nementionată in acest prospect, va rugam sa comunicati medicului dumneavoastra sau farmacistului.

## 5. CUM SE PASTREAZA TAVIPEC

A se pastra la temperaturi sub 25°C, in ambalajul original.

A nu se lasa la indemana si vederea copiilor.

Nu utilizati Tavipec dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj dupa exp.. Data de expirare se refera la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Intrebati farmacistul cum sa eliminati medicamentele care nu va mai sunt necesare. Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. INFORMATII SUPLIMENTARE

### Ce contine Tavipec

-Substanta activa este ulei volatil de *Lavandula latifolia*, 150 mg.

-Celelalte componente sunt: *capsula*: gelatina, glicerol 85%, Sunset Yellow S 85% ( E 110), Quinoline Yellow 70% ( E 104); *film gastrorezistent*: copolimerul acidului metacrilic cu acrilatul de etil (1:1), propilenglicol, polisorbat 80, monostearat de glicerol 40-55.

### Cum arata Tavipec si continutul ambalajului

Tavipec se prezintă sub formă de capsule moi gastrorezistente, ovale, de culoare galbenă, transparente, cu sigilare vizibilă, fără bule de aer, ce conțin un lichid uleios, incolor până la galben deschis, cu miros de lavandă.

Cutie cu 3 blistere din Al-PVC/PVDC a cate 10 capsule moi gastrorezistente

Cutie cu 10 blistere din Al-PVC/PVDC a cate 10 capsule moi gastrorezistente

### Definitorul autorizatiei de punere pe piata si producatorul

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.,  
6060 Absam/Tirol, Austria

### Acest prospect a fost aprobat în

August, 2012