

Tasectan® | Тазектан®

(RO) **Scopul utilizării:** Tasectan® este un dispozitiv medical folosit pentru a restabili funcția fiziologică a pereților intestinali. Este conceput specific pentru a controla și reduce simptomele asociate cu diareea provocată de diverse cauze, simptome cum ar fi tensiunea abdominală și defecările frecvente. Efectul apare în primele 12 ore. Gelatina tanat din care este compus produsul nu este modificată la nivelul stomacului și acționează prin formarea unui film care protejează mucoasa intestinală, reducând frecvența și durata episoadelor diareice.

Mod de prezentare: 20 plicuri care conțin pudră pentru uz pediatric. | Blister cu 15 capsule pentru adulți.

Compoziție: Pudra: 250 mg gelatină tanat (origine porcină). | Capsula: 500 mg gelatină tanat (origine porcină), amidon de porumb și stearat de magneziu (origine vegetală);

Instrucțiuni de utilizare: Pudra: conținutul unui plic trebuie amestecat cu o cantitate mică de lapte, suc de fructe sau apă și administrat imediat. Poate fi adăugat și în iaurt sau în alte alimente. Nu administrați produsul imediat fără a fi amestecat. | Capsula: A se înghiți capsula cu ajutorul unui lichid.

Dozaj: Copiii cu vârsta mai mică de trei ani: 1 plic la fiecare 6 ore, până la dispariția simptomelor | Copiii cu vârsta între 3 și 14 ani: 1-2 plicuri la fiecare 6 ore, până la dispariția simptomelor | Adulți și copii cu vârsta mai mare de 14 ani: 1-2 capsule la fiecare 4-6 ore, până la dispariția simptomelor.

Atenționări:

- Înainte de a începe să folosiți acest produs nu este necesar să consultați un profesionist din domeniul sănătății. Totuși, se recomandă consultul în caz de simptome severe sau persistente sau când există îndoieli cu privire la diagnostic.
- Se recomandă consultarea unui profesionist din domeniul sănătății în cazul diareei la copiii cu vârsta mai mică de 3 ani și la persoanele în vârstă, mai ales când sunt prezente și alte simptome.
- Acest dispozitiv medical nu este un tratament farmacologic. Dacă un asemenea tratament vă este recomandat de către un profesionist din domeniul sănătății, produsul poate fi administrat concomitent.
- Se recomandă consumul abundent de lichide, precum și măsurile de regim alimentar indicate în tratamentul diareei;
- Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, se recomandă ca produsul să nu fie utilizat pe durata sarcinii sau alăptării, cu excepția cazului în care este indicat de către un profesionist din domeniul sănătății.
- Nu utilizați produsul după data de expirare imprimată pe ambalaj;
- Nu folosiți produsul dacă blisterul sau plicul este deschis sau deteriorat;
- A se depozita la temperatura camerei, departe de sursele de căldură. A nu se congela;
- A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.

Contraindicații: Tasectan® nu trebuie folosit la pacienți cu hipersensibilitate cunoscută la gelatină tanat sau orice alt ingredient al produsului.

Distribuitor: Pharm.Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6067 Absam/Tirol, Austria reprezentat de Montavit Reprezentanța pentru România, Str.Poet Andrei Mureșanu nr.5, Sect.1, apt.1, București Tel/ Fax: +4021.230.33.51, office@montavit.ro

(RS) **Namena:** Tasectan® je medicinsko sredstvo koje se koristi za obnavljanje fizioloških funkcija zida creva. Formulisan je tako da kontrolise i smanjuje simptome dijareje koja je posledica različitih uzroka, kao što su abdominalni pritisak i česta stolica. Efikasan je tokom 12 sati. Želatin tanat, glavni sastojak medicinskog sredstva, ne menja se u želucu, a deluje tako što formira film koji štiti sluzokožu, smanjujući učestalost i trajanje dijareje.

Pakovanje: Dvadeset kesica koje sadrže prašak za primenu kod dece | Blister sa petnaest kapsula za primenu kod odraslih

Sastav: Prašak za pedijatrijsku primenu: želatin tanat (svinjskog porekla). | Kapsule: želatin tanat (svinjskog porekla); skrob, kukuruzni; magnezijum-starat (biljnog porekla).

Način primene: Kapsule: progutati celu kapsulu sa tečnošću. | Prašak: sadržaj jedne kesice mora se pomešati sa malo mleka, voćnog soka ili vode i odmah upotrebiti. Sadržaj kesice, takođe se može dodati u jogurt ili neku drugu hranu. Ne upotrebljavati proizvod pre nego što ga pomešate.

Doziranje: Deca mlađa od 3 godine: 1 kesica na svakih 6 sati, do prestanka simptoma. | Deca od 3 do 14 godina: 1 ili 2 kesice na svakih 6 sati, do prestanka simptoma. | Odrasli i deca starija od 14 godina: 1-2 kapsule na svakih 4-6 sati, do prestanka simptoma.

Upozorenja:

- Pre primene ovog proizvoda nije neophodno konsultovati se sa lekarom ili farmaceutom. Međutim, ukoliko su simptomi jaki i uporni ili ukoliko postoji bilo kakva sumnja u dijagnozu, konsultacije su obavezne.
- Ukoliko se dijareja javila kod dece mlađe od 3 godine i starijih osoba, a posebno ukoliko su prisutni i drugi simptomi, obavezno se treba konsultovati sa lekarom ili farmaceutom.
- Ovo medicinsko sredstvo nije farmakoterapija. Ukoliko se takvo lečenje od strane lekara ili farmaceuta, ovo medicinsko sredstvo se može primeniti istovremeno.
- Tokom terapije dijareje preporučuje se obilan unos tečnosti kao i uobičajne dijetetske mere.
- Iako neželjena dejstva nisu prijavljena, ne preporučuje se primena tokom trudnoće ili u toku dojenja, osim ako nije drugačije preporučeno od strane lekara ili farmaceuta.
- Proizvod ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe otisnutog na pakovanju.
- Proizvod ne koristiti ukoliko su blister ili kesica otvoreni ili oštećeni.
- Proizvod čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora toplote. Ne zamrzavati.
- Čuvati van domašaja i pogleda dece.

Kontraindikacije: Tasectan® ne smeju da koriste osobe koje su preosetljive (alergične) na želatin tanat ili na bilo koji drugi sastojak proizvoda.

Nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava: Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, predstavništvo Beograd, Krunska 35A, 11000 Beograd

Distributer za Srbiju: EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd

Broj rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava: 515-02-00270-16-001



NOVENTURE, S.L
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona - Spain

Rev.Rev.02: 21.11.2016
Peb. № 02: от 21.11.2016г.

05/17-106603

