

Lactofem®

SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a începe să utilizați acest dispozitiv medical, deoarece conține informații importante. Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur, deoarece poate doriți să le citiți din nou mai târziu. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți nevoie de informații sau sfaturi suplimentare.

CE SUNT LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC ȘI DIN CE SUNT FĂCUTE?

Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic sunt supozitoare albe pentru uz vaginal care conțin un amestec de acid lactic și lactat de sodiu. Supozitoarele vaginale pot fi folosite pentru a menține sau regla valoarea naturală a pH-ului vaginal.

- pentru femeile adulte
- pentru fete după consultarea unui medic
- în timpul sarcinii/ alăptării după consultarea unui medic

Dacă sunteți predispusă la infecții vaginale, tratamentul preventiv pe termen lung poate fi efectuat fără ezitare (vezi „Cum ar trebui să utilizați Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic?”).

Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic conțin (S)-Acid lactic, soluție de (S)-lactat de sodiu, macrogol 1500 și macrogol 6000. 1 supozitor vaginal conține 167 mg acid lactic și 100 mg soluție de lactat de sodiu, ceea ce corespunde unui total de 190 mg acid lactic anhidru.

Supozitoarele nu conțin parafină, vaselină și alte grăsimi.

PENTRU CE SUNT UTILIZATE LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC?

Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic sunt folosite pentru a menține și a restabili valoarea naturală a pH-ului în vagin. Menținerea sau acidificarea mediului vaginal cu acid lactic sprijină dezvoltarea bacteriilor vaginale tipice (bacteriile producătoare de acid lactic) și, în același timp, are un efect nefavorabil asupra dezvoltării agenților patogeni în zona vaginală.

Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic pot fi, prin urmare, utilizate ca măsură preventivă dacă sunteți predispusă la infecții vaginale și ca supliment la medicația pentru infecțiile vaginale.

CUM FUNCȚIONEAZĂ LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC?

Celulele mucoasei vaginale conțin glicogen, care este eliberat de bacteriile lactice în vagin după exfolierea normală a celulelor și fermentat în acid lactic după ce a fost descompus în zaharuri de către bacteriile lactice. Dacă acidul lactic este prezent în cantități suficiente, în vagin există un mediu natural acid cu o valoare a pH-ului de 3,8 - 4,5. Acestea sunt condiții nefavorabile pentru creșterea bacteriilor nedorite. Prin urmare, un mediu vaginal acid ajută la prevenirea infecțiilor bacteriene.

Mediul vaginal acid poate fi perturbat de diverși factori externi, determinând creșterea valorii pH-ului peste 4,5. Factorii posibili de influență includ secrețiile corporale, cum ar fi sângele menstrual sau lichidul seminal, o reducere a lactobacililor din cauza antibioticelor și fluctuațiilor hormonale în timpul sarcinii, alăptării sau din cauza utilizării hormonilor sexuali feminini. În astfel de condiții, este favorizată creșterea germenilor nedoriti în vagin. Acești germeni pot proveni din zona din jurul intrării vaginale (de exemplu, regiunea anală) și pot urca în vagin sau pot fi transmise în timpul actului sexual, de exemplu. Consecințele pot fi scăderea florei naturale de lactobacili și o infecție vaginală.

Pentru femeile care sunt predispuse la infecții vaginale repetate, aplicarea vaginală a acidului lactic este utilă în multe cazuri pentru a susține autoreglarea valorii pH-ului acid.

CE TREBUIE SĂ ȚINEȚI CONT ATUNCI CÂND UTILIZAȚI LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC?

Supozitoarele vaginale cu acid lactic Lactofem® sunt foarte bine tolerate. Nu trebuie luate precauții speciale la utilizare. Cu toate acestea, dacă se știe că sunteți hipersensibilă la oricare dintre ingrediente, nu trebuie să utilizați supozitoarele vaginale.

La fete, Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic trebuie utilizate numai după consultarea unui medic, deoarece nu există încă suficientă experiență pentru a face o recomandare generală de utilizare la copii și adolescenți.

Nu este recomandabil să utilizați Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic în timpul menstruației. Întrerupeți tratamentul în aceste zile.

Dacă suferiți în prezent de o infecție vaginală (de exemplu, secreții crescute, miros neplăcut al secrețiilor, mâncărimi și arsuri la intrarea vaginală), trebuie să vă consultați medicul înainte de a utiliza Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic pentru a vă clarifica simptomele și tratamentul adecvat. Poate fi necesar un tratament cu medicamente sau un tratament suplimentar al partenerului dumneavoastră.

Dacă disconfortul vaginal se înrăutățește în timpul utilizării Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic sau nu se ameliorează în decurs de 8 zile, trebuie să încetați să utilizați produsul și să consultați un medic.

Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic nu conțin un agent spermicid (un agent care ucide materialul seminal masculin) și, prin urmare, nu protejează împotriva sarcinii nedorite.

Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic se folosesc doar local.

Nu sunt de așteptat interacțiuni între Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic și alte produse utilizate în afara zonei genitale.

Cu toate acestea, Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic nu trebuie utilizate în același timp cu alte produse intravaginale. Ar trebui să existe o perioadă suficient de lungă (de exemplu, 24 de ore) între utilizarea a două produse vaginale.

Nu se știe dacă și în ce măsură supozitoarele pot afecta efectul contraceptivelor vaginale.

Utilizarea concomitentă a Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic și prezervativelor nu trebuie utilizată, astfel încât supozitoarele să-și dezvolte efectul. În plus, rezistența la rupere a prezervativelor poate fi redusă, afectând astfel siguranța acestora.

În cazul deteriorării foliei sau a unei modificări a naturii supozitoarelor, nu utilizați produsul și informați producătorul.

Sarcina și alăptarea:

Deoarece nu există date clinice privind utilizarea produsului în sarcină și alăptare, femeile însărcinate și/ sau care alăptează sunt sfătuite să-și consulte medicul înainte de a utiliza Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic.

Efecte secundare:


În cazuri rare, pot apărea reacții ușoare ale pielii (de exemplu, roșeață, arsură, mâncărime). În cazuri individuale, poate apărea o reacție alergică a pielii (de exemplu, roșeață severă, umflare, arsură). În cazuri individuale, utilizarea supozitoarelor vaginale poate provoca iritații ale mucoasei vaginale din cauza frecării, ceea ce poate duce la micro-sângerare și o secreție roz. În acest caz, vă rugăm să vă consultați medicul înainte de a continua tratamentul. Dacă observați orice alte efecte neplăcute, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Informații suplimentare:


Vă rugăm să raportați orice incident grav legat de Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic producătorului și autorității competente din țara dumneavoastră. Vă rugăm să raportați toate efectele secundare asociate cu Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic producătorului răspunzător.

CUM UTILIZAȚI LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC?

Doza unică este de un supozitor vaginal o dată pe zi, seara, înainte de culcare. Un supozitor vaginal se introduce adânc în vagin o dată pe zi, de preferință culcată pe spate, cu picioarele ușor depărtate. Pentru a preveni expulzarea prematură a supozitorului vaginal, acesta trebuie utilizat seara înainte de culcare



Pentru a îndepărta supozitorul vaginal din folie, despărțiți cele două folii de la vârful supozitorului, așa cum se arată în ilustrația de mai jos. Dacă vaginul este relativ uscat, supozitorul vaginal poate fi umezit sub jet de apă înainte de introducere, pentru a fi și mai ușor de introdus.



Vă rugăm să utilizați o protecție de lenjerie în timpul utilizării, deoarece ocazional pot apărea scurgeri apoase datorită solubilității deosebit de bune a supozitoarelor vaginale. Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic sunt destinate utilizării directe de către pacient.

CÂT TIMP PUTEȚI FOLOSI LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC?

Durata de utilizare este în general de 5 - 7 zile. Pentru a menține în mod regulat o valoare normală a pH-ului în vagin, de ex la femeile cu tendință la infecții vaginale, Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic pot fi, de asemenea, utilizate, fără ezitare de două până la trei ori pe săptămână pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă simptomele persistă sau reapar, vă rugăm să solicitați sfatul medicului.

Dacă mai aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea, vă rugăm să consultați medicul sau farmacistul.

CARE ESTE PERIOADA DE VALABILITATE A LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC?

Nu utilizați Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic după data de expirare indicată după acest simbol pe blister și pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii specificate.

CUM AR TREBUI PĂSTRATE LACTOFEM® SUPOZITOARE VAGINALE CU ACID LACTIC?

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi sub 1 °C și peste 30 °C.

INFORMAȚII DESPRE ELIMINARE

Puteți obține informații despre eliminare de la compania locală de eliminare a deșeurilor.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Lactofem® supozitoare vaginale cu acid lactic sunt disponibile în pachete de testare care conțin 2 supozitoare vaginale (mostră care nu se poate vinde) sau în pachete de dimensiune originală care conțin 7 supozitoare vaginale sau 14 supozitoare vaginale. Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie pe piață.



Producător:
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG
Schloßstrasse 11–17
79238 Ehrenkirchen
Germany
Tel.: +49 (0) 7633 909-0
Fax: +49 (0) 800 33 28 333



Distributie:
Pharm.Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
6067 Absam/Tirol, Austria
reprezentat în România de Montavit
Reprezentanța pentru România
Str.Poet Andrei Mureșanu nr.5
Sect.1, apt.1,București
Tel: +4021.230.33.51
Office.ro@montavit.com



€ 0297

Ultima actualizare: septembrie 2024